

Coriorretinopatía serosa central

La coriorretinopatía serosa central es un tipo de desprendimiento exudativo (con líquido), que se produce en la retina (fondo de ojo) generalmente a nivel de la mácula. La aparición de líquido en esta zona, hace que se vea afectada la visión en la mayoría de los casos.



Consejo General
de Colegios
de Ópticos-Optometristas

Es una enfermedad de causa desconocida que suele darse preferentemente en hombres entre 20 y 50 años, sometidos a estrés emocional importante.

SIGNOS Y SÍNTOMAS

Es una patología indolora y en ocasiones asintomática.

La queja principal es una disminución moderada de la agudeza visual. Además puede causar alguno de los siguientes síntomas: visión distorsionada, los colores se ven apagados u opacos, las líneas rectas se ven curvas y al leer se ve borroso. Así como un deterioro en la adaptación a la oscuridad. En casos aislados, estos síntomas pueden ir acompañados de una cefalea (dolor de cabeza) parecida a la migraña.

Se ha podido demostrar que el estrés puede ser un factor desencadenante de la enfermedad. El embarazo y algunos tratamientos con corticoides también pueden provocarla.

MANEJO CLÍNICO USUAL

El 90% de los casos, suele resolverse de manera espontánea. Y, en pocos meses, se produce una restauración satisfactoria de la agudeza visual.

Los casos en los cuales exista persistencia de líquido seroso y sus síntomas persistan más de 6 meses, el tratamiento más adecuado será láser. También pueden tratarse de la misma forma, los casos que requieran una rápida recuperación de la agudeza visual.