

Orzuelo

El orzuelo es una infección localizada en las glándulas de Meibomio. Las glándulas de Meibomio se encuentran en el borde de los párpados y se encargan de lubricar el ojo, mediante un compuesto aceitoso que producen y vierten en la lágrima.



Consejo General
de Colegios
de Ópticos-Optometristas

PREVENCIÓN Y MANEJO CLÍNICO USUAL

Si la persona tiene tendencia a tener orzuelos, es conveniente lavarse los párpados diariamente con un jabón indicado. Algunos jabones neutros diluidos pueden aplicarse utilizando un bastoncillo de algodón.

Está indicado el uso de antibiótico en pomada.

Aunque no es una condición grave y normalmente no pasa de ser una infección muy localizada, es necesario tratarla adecuadamente, ya que si no, existe la posibilidad de que se extienda por el párpado.

CAUSAS

Infección comúnmente causada por una bacteria del género estafilococo.

SIGNOS Y SÍNTOMAS

Los más comunes son:

- Dolor localizado en el párpado de un ojo.
- Tumefacción y enrojecimiento localizado en el párpado.

CURSO DE LA ENFERMEDAD

Normalmente un orzuelo desaparece en pocos días y no tiene mayor importancia. En algunos casos el foco infeccioso se encapsula permaneciendo un quiste indoloro llamado chalazión.

Si el chalazión no remite en un par de meses, puede ser necesaria la cirugía para eliminarlo.