

Ptosis palpebral

Se denomina ptosis palpebral a la caída del párpado. Puede afectar a uno o a ambos párpados. La ptosis puede ser parcial o total y según el momento de aparición puede ser congénita (presente en el nacimiento) o adquirida.



Consejo General
de Colegios
de Ópticos-Optometristas

Cuando el borde del párpado superior cae, éste puede obstaculizar el campo de visión superior. Por tanto, la ptosis se puede clasificar en: **leve**, si tapa solamente la parte superior de la pupila, o **severa** cuando la tapa completamente.

CAUSAS

En los niños que nacen con ptosis, esta suele deberse a un desarrollo imperfecto del músculo elevador del párpado. En estos casos, pueden desarrollar posteriormente ojo vago, estrabismo y/o visión borrosa.

En los adultos, las causas por las que se produce ptosis palpebral son: edad avanzada, un traumatismo, una enfermedad del músculo elevador del párpado o desórdenes neurológicos.

SÍNTOMAS

Los síntomas más comunes que manifiestan las personas que tienen ptosis palpebral son:

- Agudeza visual reducida.
- Defecto de campo visual.
- Cefalea o dolor de cabeza.
- Visión doble.

MANEJO CLÍNICO USUAL

Generalmente el tratamiento es quirúrgico. Su finalidad es elevar el párpado superior para obtener así un mayor desarrollo visual.

Se puede hablar de distintos tipos de cirugía en función del grado y la fuerza del músculo elevador.